

## SKIEPŲ NUO ERKINIO ENCEFALITO GRAFIKAS

Pagrindinis skiepijimas	Dozė	Įprastinis planas	Greito skiepijimo planas
I dozė	0,5 ml	Pasirinkta data	Pasirinkta data
II dozė	0,5 ml	Nuo 1 iki 3 mėnesių po I vakcinacijos	7–14 dienų po I vakcinacijos*
III dozė	0,5 ml	Nuo 5 iki 12 mėnesių po II vakcinacijos	Nuo 5 iki 12 mėnesių po II vakcinacijos*
I revakcinacija	0,5 ml	3 m. po III vakcinacijos*	
Revakcinacija Priklausomai nuo vakcinos* pacientams nuo 16 iki 60 m. amžiaus arba pacientams nuo 12 iki 49 m. amžiaus	0,5 ml	Kas 5 metus	
Revakcinacija Priklausomai nuo vakcinos* pacientams vyresniems kaip 60 m. amžiaus arba vyresniems kaip 49 m. amžiaus	0,5 ml	Kas 3 metus	

\*Šiuo metu yra galimybė pasiskiepyti dviem vakcinomis nuo erkinio encefalito, todėl skiepijimo grafikas gali skirtis.

**Apsauginis imunitetas susiformuoja tik sulėidus dvi skiepo dozes**, praėjus dviem savaitėms po antros dozės. Jis apsaugo nuo ligos tik vienus metus. Po trečios skiepo dozės apsauginis imunitetas trunka 3–4 metus.

Vėliau reikalingos stiprinamosios dozės. Stiprinamųjų dozių įskiepijimų intervalai skirtingi, nelygu vakcinos gamintojo rekomendacijos bei žmogaus amžius (dažniausiai kas 3–4 m.).

Jeigu po pirmos skiepo dozės skiepijimas nutrūko, skiepijimo schema turi būti pradėta iš naujo. Jeigu po dviejų skiepo dozių nebuvo išlaikytas skiepijimo intervalas, skiepijimo schemą galima tęsti toliau, tiesiog įskiepijant trečią dozę.

Jeigu buvo užmiršta sustiprinamoji skiepo dozė, pakanka ją įskiepyti, skiepijimo schemas kartoti nereikia.

Laikotarpiu tarp praleistų skiepijimo dozių gali nebūti reikiamo apsauginio imuniteto, todėl įsisiurbus užsikrėtusiai erkei žmogus gali susirgti.

**Nuo erkinio encefalito skiepyti galima jau vienu metų vaikais.**

Parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informaciją