

Šeškinės poliklinika
ŠEIMOS GYDYTOJO SKIRIAMI PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMI TYRIMAI

1 lentelė. Sveikatos tyrimai, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę

Atliekami tyrimai	Iki 18 metų	19–65 m.	Nuo 65 metų
Bendras kraujo tyrimas	9–12 mėn. amžiaus 6–7 m. amžiaus	1 kartą per 2 m.	1 kartą per 2 m.
Bendras šlapimo tyrimas	12–18 mėn. amžiaus 6–7 m. amžiaus, nuo 10 m. 1 kartą per 2 m.	1 kartą per 2 m.	1 kartą per metus
Gliukozės kiekis kraujyje		1 kartą per 2 m.	1 kartą per metus
Cholesterolio kiekis kraujyje		1 kartą per metus	1 kartą per metus
Koprograma	Tyrimas dėl helmintozių, atliekamas profilaktiškai 6-7 m. amžiaus vaikams prieš pradėdant lankyti ikimokyklinio arba pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą ikimokyklinio arba pradinio ugdymo įstaigą		

2 lentelė. Šeimos gydytojo normoje numatyti tyrimai, reikalingi šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus

Tyrimo pavadinimas	Diagnozė pagal TLK-10-AM	Indikacijos nemokamam tyrimui	Tyrimo atlikimo dažnis
Bendras kraujo tyrimas (BKT)		Prieš atliekant dienos chirurgijos, kitas planines invazines ir (ar) intervencines procedūras (ne anksčiau kaip prieš dvi savaites iki paslaugos)	
	Z02.5 Z10.3	Sportuojantiems asmenims kartą per metus, pagal indikacijas	1 k.
		4-6 mėn. amžiaus kūdikiams, priskirtiems rizikos grupei: -jeigu gimė neišnešiotas, -jei buvo ABO ar Rh nesuderinamumas; -įgimtos infekcijos; -iš daugiavaisio nėštumo, mažo gimimo svorio (<2500 g)	1 k.
		15-18 mėn. amžiaus rizikos grupių vaikams: -jeigu gimė neišnešiotas, -jei buvo ABO ar Rh nesuderinamumas; -įgimtos infekcijos; -iš daugiavaisio nėštumo, mažo gimimo svorio (<2500 g) - kurių racione >600 ml karvės, ožkos pieno; - kurių tėvai vegetarai; - kurie turi specialiųjų sveikatos poreikių (serga lėtinėmis ligomis, serga dažnai, nustatytas neharmoningas augimas)	1 k.
		Vaikams nuo 10 iki 18 m., pilnamečiui mokiniui, jei yra šie rizikos veiksniai: -neracionali mityba (ypač – vegetarams), -gausios menstruacijos, -pacientas sportuoja, -gyvena blogomis socialinėmis sąlygomis, -augimo spurto metu,	1 k. / 2 m.

		- jei paauglys netenka kūno masės	
	Z34 - Z36	Nėščiosioms: -pirmo apsilankymo metu iki 13 ⁺⁶ nėštumo sav.; -nuo 32 ⁺⁰ iki 34 ⁺⁶ nėštumo sav.	1 k.
	I10 - I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. /m.
	I50, I20, I48	Nustatant ŠN, įtariant krūtinės angina, diagnozavus PV, PP	1 k.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
C reaktyvinis baltymas		Karščiavimas, reumatinių susirgimų įtarimas, jų kontrolė dinamikoje.	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)		Onkologinių, reumatinių susirgimų įtarimas	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Gliukozė (GLU)		Prieš atliekant dienos chirurgijos, kitas planines invazines ir (ar) intervencines procedūras (ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki paslaugos)	
		Paaugliams (10 – 18 m.), pilnamečiams mokiniams, jei yra šie klinikiniai simptomai: poliurija, polidipsija, svorio kritimas, nuovargis. Nuo 10 m. arba prasidėjus lytinei brandai, kai KMI viršija 85 procentilę ir yra rizikos veiksnių, tokių kaip CD ir (arba) širdies ir kraujagyslių sistemos ligos šeimoje, atsparumo insulinui požymių (juodoji akantozė, dislipidemija, hipertenzija, policistinių kiaušidžių sindromas). Visiems, kurių KMI viršija 95 procentilę pagal amžių ir lytį	1 k. / 2 m.
		Z34 - Z36 Nėščiosioms pirmo vizito metu iki 13 ⁺⁶ sav.	1 k.
		I10 – I15 Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
		E09, E15 – E16 Įtariant angliavandenių apykaitos sutrikimus	1 k.
		I20 Įtariant krūtinės angina	1 k.
		I48 Diagnozavus PV, PP	1 k.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Lipidograma	E78	Įtariant arba diagnozavus šeiminių dislipidemiją	1 k.
	E78	Diagnozavus dislipidemiją, prieš pradėdant antilipidinį gydymą turi būti atliktos 2 lipidogramos 1 – 12 sav. skirtumu. Pradėjus antilipidinį gydymą lipidogramą kartoti po 8 – 12 sav., kol bus pasiekta rekomenduojama cholesterolio koncentracija	Taikant gydymą antilipidiniais vaistais ir pasiekus rekomenduojamą cholesterolio koncentraciją, rekomenduojama lipidogramą atlikti 1 k. / 1 m.
	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
	E01 – E03	Diagnozuotas CD	Esant CD rizikos veiksniams arba bent 1 k. / 1 m.

	E10 – E13		
	E10	CD sergantiems vaikams	Sergant 1 tipo CD, atliekama nuo 11 m. ligos pradžioje (pasiekus ligos kompensaciją), nesant pokyčių, kartojama 1 k./5 m. Sergant 2 tipo CD, atliekama pasiekus glikemijos kontrolę arba po 3 mėn. nuo ligos nustatymo. Tyrimas atliekamas 1 k. / 1 m.
	I20	Atlikti b. cholesterolį įtariant krūtinės anginą	1 k.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Bendrasis šlapimo tyrimas (BŠT)	Z02.5 Z10.3	Sportuojantiems asmenims kartą per metus, pagal indikacijas	1 k.
	Z34 – Z36	Nėščiosioms: -pirmo apsilankymo metu iki 13 ⁺⁶ nėštumo sav., -14 ⁺⁰ - 28 ⁺⁶ nėštumo sav., -29 ⁺⁰ - 40 ⁺⁶ nėštumo savaitę	1 k.
	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
	I50	Nustatant ŠN	1 k.
Albumino, kreatinino (AK) santykis šlapime	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
	I10 – I15 N18.1 – N18.5 I50	Gydant AH ir nustačius LIL (kartu tiriamas K, kreatininas ir aGFG)	1 k. / 1 m. arba dažniau, priklausomai nuo LIL stadijos ir nuolatinės albuminurijos lygio (atliekami AH aprašo 9 priede nurodytu dažniu)
	E10-11	Atliekamas CD nefropatijai nustatyti	1 tipo CD sergantys pacientai dėl lėtinių CD komplikacijų pirmą kartą turi būti tiriami praėjus 2 m. nuo ligos pradžios, o 2 tipo CD atveju – diagnozės nustatymo metu. Vėliau – 1 k. / 1 m., esant bet kuriam CD tipui. Jei A/K santykis >3 mg/mmol, tyrimas kartojamas 2 k. per 3-6 mėn. Diagnozė patvirtinama nustačius bent 2 patologinius rezultatus.
	E10	Vaikams, sergantiems CD	1 k. /1 m. nuo 11 m. amžiaus, praėjus 2 m. nuo ligos pradžios
Alaninė transaminazė (ALT)		Vartojant hepatotoksinius vaistus (nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai, priešgrybeliniai, priešepilepsiniai medikamentai)	1k./ 1m.
		Reumatoidinis artritas (gydymas biologine terapija kas 3 mėn. pagal SAM)	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	1k./ 1m.
Asparaginė transaminazė	E78	Tirti AST prieš pradėdant gydymą antilipidiniaisiais vaistais, 1 k. po 8 - 12 sav. pradėjus gydymą	1 k. Jei AST koncentracija padidėjusi iki

(AST)		arba padidinus dozę. Vartojant statinus rutininis AST tikrinimas yra neindikuo­tu­nas	3 k. daugiau nei norma, tęsti antilipidinių gydymą ir kartoti tyrimą po 4 – 6 sav. Jei AST koncentracija padidėjusi 3 k. ir daugiau kartų nei viršutinė normos riba, rekomenduojama nutraukti antilipidinių gydymą arba sumažinti antilipidinių vaistų dozę ir atlikti tyrimą po 4 – 6 sav.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Šarminė fosfatazė (ŠF)	I50	Diagnozuojant ŠN	1 k.
		Intrahepatinė ir ekstrahepatinė cholestazė; navikai kasoje; metastaziniai navikai kepenyse, kauluose; reumatinės ligos	1k./1m.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Bilirubinas	I50	Diagnozuojant ŠN	1 k.
		Žiliberio sindromas; Lėtiniai virusiniai hepatitai, jų paūmėjimas; Kūdikiams, esant hemolizinei naujagimių ligai	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Tireotropinis hormonas (TTH)	E10	Atliekamas vaikams, sergantiems 1 tipo CD	Patvirtinus diagnozę ir vėliau 1 k. / 1 m. Jei nustatomi teigiami antikūnai (Anti-TPO, Anti-TG), skydliaukės funkcija tiriama kas 6 – 12 mėn.
		Skydliaukės ligomis sergančių pacientų gydymo kontrolei pagal endokrinologų rekomendacijas	
		Kliniškai įtariant skydliaukės hormonų veiklos pokyčius	
		Atsiradus širdies veiklos sutrikimams	
		Pacientams, vartojantiems Cordaroną	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Kalis (K)		Prieš atliekant dienos chirurgijos paslaugas (ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki paslaugos)	
	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
	I10 – I15 N18.1 – N18.5	Atliekamas gydant AH ir nustačius LIL (kartu tiriamas kreatininas ir aGFG ir albuminurija)	1 k. / 1 m. arba dažniau, priklausomai nuo LIL stadijos ir nuolatinės albuminurijos lygio (atliekami AH aprašo 9 priede nurodytu dažniu)
	I50	Nustatant ŠN ir gydant ŠN AKFI	Vartojant AKFI – praėjus 3 d. po kiekvienos dozės pakeitimo, o esant nuolatiniam vartojimui – 1 k. / 1 mėn.

	I10 – I15 N18.1 – N18.5 I50	Prieš pradėdant ir toliau gydant aldosterono antagonistais (pvz., spironolaktonu)	Jeigu aGFG yra <45ml/min./1,73m ² ir K konc. >4,5 mmol/l – aldosterono antagonistų skyrimo reikėtų vengti. Kontroluoti K ir kreatinino koncentraciją praėjus 5-7 d. po naujo skyrimo arba dozės pakeitimo ir 1 k. / 1 sav. kai dozė pastovi.
	I48, I49.1 – I49.4, R00	Nustatant PV, PP arba įtarus ekstrasistoliją	
		Pacientams, pastoviai vartojantiems kilpinius ar kalį sulaukančius diuretikus, kalio preparatus	1k./ 1m.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Natris (Na)	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
	I50	Nustatant ŠN	1 k.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Kreatininas	I10 – I15	Nustatant AH, papildomai apskaičiuojant aGFG	1 k.
	I10 – I15 N18.1 – N18.5	Gydant AH ir nustatant LIL (kartu tiriamas kreatininas ir aGFG ir albuminurija)	1 k. / 1 m. arba dažniau, priklausomai nuo LIL stadijos ir nuolatinės albuminurijos lygio (atliekami AH aprašo 9 priede nurodytu dažniu)
	I10 – I15 N18.1 – N18.5 I50	Prieš pradėdant ir toliau gydant aldosterono antagonistais (pvz., spironolaktonu)	Jeigu aGFG yra <45ml/min./1,73m ² ir K konc. >4,5 mmol/l – aldosterono antagonistų skyrimo reikėtų vengti. Kontroluoti K ir kreatinino koncentraciją praėjus 5-7 d. po naujo skyrimo arba dozės pakeitimo ir 1 k. / 1 sav. kai dozė pastovi.
	I50	Nustatant ir gydant ŠN AKFI	Vartojant AKFI – praėjus 3 d. po kiekvienos dozės pakeitimo, o esant nuolatiniam vartojimui – 1 k. / 1 mėn.
	E10.2 E11.2 E13.2. E.14.2 N18.1 – N18.5	CD gydymo veiksmingumui, lėtinės insktų ligos stadijai įvertinti nustatomas GFG	1 k. / 1 m. esant bet kuriam CD tipui. Gydytojui nefrologui konsultuoti siunčiama, kai GFG < 30ml/min./1,73 m ² arba anksčiau, jei progresuoja proteinurija, sparčiai blogėja insktų funkcija arba atsiranda hematurija.
		Reumatoidinis artritas	
		Ilgą laiką vartojant nesteroidinius priešūždegiminius preparatus	
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Šlapimo rūgštis	I10 – I15	Nustatant ir gydant AH	1 k. / 1 m.
		Kitoms šeimos gydytojo kompetencijai	

		priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus	
Gliukozės koncentracijos mėginys (GTM)	R73 E09	CD diagnozei patvirtinti, esant CD būdingiems simptomams, jei gaunami prieštaringi glikemijos tyrimo veninėje kraujo plazmoje rezultatai	1 k.
	R73 E09 E28.2 E65 E66 E78 I10 – I15 O24.4 B23	1. CD diagnozei patvirtinti, nesant CD klinikinių simptomų, 2 tipo CD įtariamas esant bent vienam iš šių kriterijų: 1.1. KMI ≥ 25 kg/m ² ir yra bent 1 iš šių rizikos veiksnių: 1.1.1. CD serga pirmos eilės giminės; 1.1.2. policistinių kiaušidžių sindromas; 1.1.3. dislipidemija; 1.1.4. širdies ir kraujagyslių sistemos ligos; 1.1.5. arterinė hipertenzija; 1.1.6. nustatytos kitos ligos arba sveikatos sutrikimai, susiję su atsparumu insulinui; 1.1.7. fizinio aktyvumo stygius; 1.2. diagnozuota tarpinė hiperglikemija; 1.3. Moterys, kurioms buvo nustatytas nėščiųjų diabetas; 1.4. asmenys, vyresni nei 45 m.; 1.5. infekuotieji ŽIV. 2. Vaikams ir paaugliams, jei yra padidėjusi kūno masė (KMI > 85 procentilės pagal amžių ir lytį) ir yra bent 1 iš šių rizikos veiksnių: 2.1. motina sirgo ND nėštumo metu; 2.2. CD tarp pirmos eilės giminaičių; 2.3. klinikiniai atsparumo insulinui požymiai (pvz., juodoji akantozė, AH, policistinių kiaušidžių sindromas)	Atlikti 1 k. / 3 m. esant bent vienam iš 2 tipo CD rizikos veiksnių
	R73 E09	Pacientams, kuriems pasireiškė gliukozės tolerancijos sutrikimas (GTS) arba sutrikusi glikemija nevalgius (SGN)	1 k. / 1 m.
	O24	Moterims, kurioms buvo diagnozuotas nėščiųjų (gestacinis) diabetas, praėjus 6-12 sav. po gimdymo kartojamas GTM ir nustatoma galutinė diagnozė: CD, GTS, SGN arba normali gliukozės tolerancija	1 k.
Prostatos specifinis antigenas	C61	Po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo	PSA lygį pirmaisiais metais po radikalaus gydymo rekomenduojama tikrinti kas 3 mėn., praėjus 2 – 3 m. – kas 6 mėn., o toliau, PSA lygiui nedidėjant, 1 k. / 1 m.

3 lentelė. Nemokami prevencinių programų tyrimai.

Preveninė	Paslaugos	Tyrimo pavadinimas	Diagnozė	Indikacijos tyrimui	Tyrimo
-----------	-----------	--------------------	----------	---------------------	--------

programa	kodas		pagal TLK-10-AM		dažnis
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa	2029	Gliukozė (GLU)	Z13.6	Vyrams nuo 40 – 54 m. (imtinai), moterims nuo 50 – 64 m. (imtinai)	1 k. / 1 m.
		Lipidograma (Chol, DTL-C, MTL-C, TG)			
		Gliukozės tolerancijos mėginys (GTM)			
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	3023	Slapto kraujavimo išmatose testas iFOBT neigiamas (-)	Z12.1	Asmenims nuo 50 m. iki 74 m. (imtinai)	1 k. / 2 m.
	3024	Slapto kraujavimo išmatose testas iFOBT teigiamas (+)			
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	2035	PSA kiekis yra 3ng/ml arba didesnis	Z12.5	Vyrams nuo 50 iki 69 m. (imtinai) ir vyrams nuo 45 m., jeigu jų tėvai arba broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu	Urologo konsultacija
	3496	PSA kiekis 1 ng/ml ir mažesnis			1 k. / 5 m.
	3497	PSA kiekis didesnis nei 1 ng/ml ir mažesnis kaip 3 ng/ml			1 k. / 2 m.
	3498	kai PSA kiekis 2 ng/ml ir mažesnis			1 k. / 5 m.
	3499	kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 ng/ml ir mažesnis nei 3 ng/ml			1 k. / 2 m.
Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	3902	Informavimas ir siuntimas atlikti mamografiją	Z12.3	Moterims nuo 50 m. iki 69 m. (imtinai)	1 k. / 2 m.
	3903	Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimo paslauga			
Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	1845	Informavimo paslauga	Z12.4	25-59 m. (imtinai)	1k./1m. iki kol nebus atliktas citologinis tyrimas 1 k. / 3 m.
	1844	Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas		Moterims nuo 25 iki 34 m. (imtinai). Pacientei pageidaujant atlikti citologinį tyrimą iš skystų terpių, reikės papildomai mokėti	
	3920	Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas		Moterims nuo 35 m. iki 59 m. (imtinai). Jei AR ŽPV rezultatas teigiamas, kartu atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje	
	3921	Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV neinformatyvus			
	3922	Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui			

		atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV neigiamas			
--	--	--	--	--	--

4 lentelė. Skatinamosios paslaugos.

	Glikolizintas hemoglobinas (HbA1c)
3415	HbA1c, kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie negydomi insulinu)
3416	HbA1c, kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu)
3417	HbA1c, kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu)
3418	HbA1c, kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento (pacientams, kurie gydomi insulinu)
	Kraujo krešumo tyrimai
3639	Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga
	Kraujo tyrimai prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą
3199	Protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas
3200	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas
3201	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
	Nėščiųjų skatinamosios paslaugos
2650	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
2651	Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama
2652	Kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)
2653	Kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų
3589	Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai
3590	Kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)
3133	Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomai bakterijai nustatyti
3134	Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomai bakterijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas
	Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu
3185	RPR testas
3186	TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)
3187	ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)
	Vaikų skatinamosios paslaugos
3452	A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis
3288	Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams
	Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos
3954	Anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas neigiamas rezultatas.
3955	Anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas teigiamas rezultatas.
3956	Anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims (kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, asmenims, kurie aktyviai vartoja švirkščiamuosius narkotikus, yra užsikrėtę ŽIV infekcija, ir asmenims, gydomiems priklausomybės ligų klinikose, neatsižvelgiant į amžių ir lytį. Anti-HCV testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas šio testo rezultatas.), kai gaunamas neigiamas rezultatas
3957	Anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims (kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, asmenims, kurie aktyviai vartoja švirkščiamuosius narkotikus, yra užsikrėtę ŽIV infekcija, ir asmenims, gydomiems priklausomybės ligų klinikose, neatsižvelgiant į amžių ir lytį. Anti-HCV testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas šio testo rezultatas.), kai gaunamas teigiamas rezultatas
	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos
3947	COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitis SARS-CoV-2 antigeno testas (testas įsigyjamas ASPĮ lėšomis) (PAASP)